EN QUILMES, BERAZATEGUI Y FLORENCIO VARELA AL DENGUE EN ALGUNOS BARRIOS, SE SUMA EL PELIGRO DEL HANTAVIRUS

En muchos casos hay denuncias de existencia del mosquito Aedes Aegyptus, que es el de patas con rayitas blancas transmisor del dengue y la gente que lo denuncia tanto en barrios de Quilmes como zonas periféricas de Berazategui y algunos barrios poblados de Florencio Varela, además se queja de falta de fumigación de parte de los Municipios, sin embargo esta tarea efectuada en la calle o pastizales no sirve para nada.

¿Porqué es así? simple, el mosquito se cría dentro de las propias casas, en jardines que conservan macetas o “tachitos de agua” que no se cambia nunca; en recipientes o cacharros olvidados en algún rincón que juntan agua y nadie ve, ni se preocupa en dar vuelta, en botellas vacias que quedan contra una pared con el pico sin tapa, etc., es decir que erradicar el mosquito transmisor y el Dengue es tarea de cada uno, es revisar cada rincon del terreno y tirar o dar vuelta todo lo que pueda acumular agua servida, si no se hace esto casa por casa, el mosquito en horas de la tarde se despierta y pica de la cintura hacia abajo, no lo hace de noche.

Respecto al Hantavirus le dejamos el parte Municipal que lo explica perfectamente y también hay responsabilidad vecinal, de no generar basurales a cielo abierto.

Secretaría de salud recuerda medidas preventivas contra Hantavirus

La secretaría de Salud informa que si bien no se han detectados casos confirmados de Hantavirus en el distrito, es importante recordar de qué se trata esta enfermedad y principalmente cómo se puede prevenir.

¿Qué es el Hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta. Los ratones silvestres (principalmente los colilargos) lo transmiten a las personas, eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina.

¿Cómo se transmite?

Por inhalación: Es la causa más frecuente. Ocurre cuando respiramos en lugares abiertos o cerrados (galpones, huertas, pastizales) donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente.

Por contacto directo: Al tocar las heces o la orina de estos roedores

Por mordeduras: Al ser mordidos por roedores infectados.

¿Cuáles son los síntomas y el tratamiento?

Los síntomas **se parecen a un estado gripal:** fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas (dolores de cabeza) náuseas, vómitos, y a veces dolor abdominal y diarrea. Después de algunos días puede haber dificultad respiratoria que puede agravarse produciendo lo que se conoce como “síndrome cardiopulmonar por hantavirus”, que si bien es poco frecuente puede llevar a la muerte si no ser tratado a tiempo.

No existe tratamiento específico. Aquellos pacientes con síndrome cardiopulmonar por hantavirus deben ser asistidos en establecimientos hospitalarios, de preferencia con unidades de terapia intensiva que cuenten con asistencia respiratoria mecánica.

¿Cómo se previene?

– Evitar la convivencia con **roedores** y el contacto con sus secreciones

– Evitar que los roedores entren o hagan **nidos** en las viviendas

– Tapar **orificios** en puertas, paredes y cañerías, mantener la higiene con agua y lavandina, colocar huertas y leña a más de 30 mts de las viviendas, cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 mts alrededor del domicilio.

– Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados (viviendas, galpones). Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo húmedo antes de ingresar.

– Realizar la limpieza (pisos, mesas, cajones y alacenas) con una parte de lavandina cada diez de agua (dejar 30 minutos y luego enjuagar). – Humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo.

– Al acampar hacerlo lejos de maleza y basurales, no dormir directamente sobre el suelo y consumir agua potable.

– **Si se encuentra un roedor vivo:** usar veneno para roedores o tramperas para capturarlo (no intentar tocarlo o golpearlo).

– **Si se encuentra un roedor muerto**: rociarlo con lavandina junto con todo lo que haya podido estar en contacto y esperar un mínimo de 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y enterrarlo a más de 30 cm de profundidad o quemarlo.

– Usar calzado cerrado y pantalones largos.

– Se recomienda no molestar y preservar a los depredadores de roedores (lechuzas, chimangos, lechuzones).

Ante la sospecha de síntomas relacionados y el antecedente de realización de actividades con sospecha de exposición a la orina, saliva y/o excretas de roedores **en las últimas 6 semanas**, se deberá concurrir inmediatamente a un centro de salud más próximo a su domicilio el cual se encargará del manejo del enfermo y de la notificación obligatoria a las autoridades del área Epidemiológica del Ministerio de Salud.

Para mayor información comunicarse con la Dirección de Bromatología y Zoonosis, ubicada en 501-Sipe Sipe Nº 3900 entre 576 y Av. Humahuaca ó a los teléfonos 4287-9361 / 4255-1738.